

الفول السوداني

www.bonyan-ye.org



الفول السوداني

”

الفول السوداني يدر عائدًا نقداً سريعاً للمزارع أفضل من غيره من المحاصيل الصيفية الأخرى علاوة على قصر مدة بقائه بالأرض.

ينصح بزراعة الأصناف الموصى بها والمجرية من قبل المزارعين، العالية الإنتاجية ذات الصفات الجيدة والمقاومة للأمراض لأنها تساهم في زيادة معدل الإنتاج علاوة على النوعية الجيدة للمحصول.

التربية المناسبة : تجود زراعة الفول السوداني في الأراضي الرملية والصفراء الخفيفة ولا تنجح زراعته في الأراضي الطينية أو الثقيلة حيث يسبب ذلك تغير لون النمار وتعرضها للإصابة بالأعفان وعدم إكمال نضج القرون وتغير لونها مع إنخفاض كمية المحصول



حراثة الأرض : تُحرث الأرض حرثتين لتهوية وتشميس التربة والقضاء على الحشائش كما ينصح بري الأرض رية خفيفة قبل الحرث للتخلص من نسبة كبيرة من الحشائش أما في الأراضي الرملية فيكتفى بحرثة واحدة

الترديم : من العمليات الهامة التي تعمل على زيادة كمية المحصول وذلك بإجراء عملية تكوييم التراب حول جذع وجذور النباتات وعدم تركها للظهور من تحت التربة

ميعاد الزراعة : من أهم العوامل التي تؤثر على إنتاجية ونوعية المحصول الناتج وأنسب ميعاد لزراعة الفول السوداني خلال الفترة من منتصف شهر أبريل إلى منتصف شهر مايو وفي حالة الأصناف القصيرة يمكن أن تمتد فترة زراعتها حتى الأسبوع الأول من يونيو لقصر مدة مكثه في الأرض

”

الترقيع : يراعى عدم التأخير في ترقيع الحفر التي لم تنبت بحيث تتم هذه العملية بعد حوالي أسبوع من خروج البادرات من تحت التربة، لضمان نضج وجني المحصول في وقت واحد

الغزير : من أهم العمليات الزراعية التي تعمل على التخلص من الحشائش بالإضافة إلى الترديم حول النباتات حتى يصبح النبات في وسط الخط مما يساعد على تكوين القرون ويحتاج مرة إلى ثلاث مرات حسب إنتشار الحشائش بالتربيه

الري : يراعى العناية بالري حيث تؤدى الزيادة أو الإسراف في مياه الري إلى زيادة إنتشار الأمراض بحيث يكون الري كل 4 - 6 أيام حسب نوع التربة وحرارة الجو وتطول الفترة كلما كانت النباتات، ويوقف الري عند إكمال النضج وقبل الحصاد بحوالي أسبوع في الأراضي الرملية واسبوعين في الأراضي الطميّة

مكافحة الآفات:

يصاب محصول الفول السوداني بالعديد من الفطريات والنematoda التي تتواجد في التربة والتي تصيب الجذور والقرون، كما يتعرض المحصول لبعض الآفات الحشرية خلال مراحل نموه المختلفة وإناث الحشائش مما يسبب إنخفاض كبير في كمية ونوعية المحصول الناتج. وفي الغالب يكون السبب في زيادة مياه الري وعدم حراثة وتشميس التربة جيداً قبل الزراعة.

وللحد من هذه الأمراض والآفات يتبع المزارع الخطوات التالي:

- 01 عدم تكرار الزراعة في نفس الأرض بصورة متتالية.
- 02 الزراعة على عمق مناسب والمواعيد المناسبة.
- 03 فرد التقاوبي وإستبعاد المصايب منها.
- 04 تجنب التفريط بالري والتسميد الأزوتي.
- 05 حرق مخلفات النباتات المصابة.

